

**ΧΗΜΕΙΑ**  
**ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ**  
**6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014**  
**ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ**

**ΘΕΜΑ Α**

A1.  $\rightarrow \gamma$ ,      A2.  $\rightarrow \beta$ ,      A3.  $\rightarrow \alpha$ ,      A4.  $\rightarrow \beta$ ,      A5.  $\rightarrow \beta$

**ΘΕΜΑ Β**

B1.a.  $\rightarrow \Lambda$ ,    β.  $\rightarrow \Lambda$ ,    γ.  $\rightarrow \Sigma$ ,    δ.  $\rightarrow \Sigma$ ,    ε.  $\rightarrow \Sigma$

**B2. a.** Διαφορές μεταξύ σ και π δεσμού:


1. Ο δεσμός π δημιουργείται μόνο εφ' όσον έχει προηγηθεί ο σχηματισμός ενός σ δεσμού.
2. Ο σ δεσμός είναι ισχυρότερος των π καθώς στην πρώτη περίπτωση επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αλληλοεπικάλυψη τροχιακών.
3. Ο σ δεσμός προκύπτει με αξονική αλληλοεπικάλυψη τροχιακών ενώ ο π με πλευρική αλληλοεπικάλυψη τροχιακών.
4. Ο σ δεσμός προκύπτει με επικαλύψεις s-s, s-p και p-p ατομικών τροχιακών ενώ ο π δεσμός προκύπτει με πλευρική αλληλοεπικάλυψη p-p ατομικών τροχιακών.

Σημ. Ενδεικτικά ο μαθητής απαντάει σε δύο.

**β.** Παρατηρούμε ότι  $E_{i3} >> E_{i2}$ .

Συμπεραίνουμε ότι με την αποβολή του 2<sub>ου</sub> ηλεκτρονίου το στοιχείο αποκτά δομή ευγενούς αερίου άρα έχει 2 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα. Συνεπώς ανήκει στη 2<sup>η</sup> ομάδα του περιοδικού πίνακα.

**γ.** Ο πρωτολυτικός δείκτης ιοντίζεται σύμφωνα με την αντίδραση:





$$pK_a = 5 \text{ άρα } K_a = 10^{-5}$$

$$pH = 3 \Rightarrow -\log [\text{H}_3\text{O}^+] = -\log 10^{-3} \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3} \text{ M}$$

$$K_a = \frac{[\Delta^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{ΗΔ}]} \Rightarrow \frac{[\Delta^-]}{[\text{ΗΔ}]} = \frac{K_a}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-5}}{10^{-3}} = 10^{-2} = \frac{1}{100}$$

Επομένως  $[\text{ΗΔ}] = 100 [\Delta^-]$  άρα υπερισχύει η όξινη μορφή του δείκτη και το δ/μα θα αποκτήσει κόκκινο χρώμα.

**δ.** Το άλας διίσταται σύμφωνα με την αντίδραση:



Εφόσον το δ/μα είναι βασικό pH = 8 άρα [OH] > [H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>] και η αρχική συγκέντρωση των ιόντων είναι ίδια

$$\text{άρα } K_{b_{\text{A}^-}} > K_{a_{\text{NH}_4^+}}$$

$$\frac{K_W}{K_{a_{\text{NH}_4^+}}} > \frac{K_W}{K_{b_{\text{A}^-}}}$$


$$K_{b_{\text{NH}_3}} > K_{a_{\text{HA}}}$$

$$K_{a_{\text{HA}}} < 10^{-5}$$

## ΘΕΜΑ Γ



### Γ1.

**α.** Σε μέρος από το περιεχόμενο του δοχείου προσθέτουμε αιμοωνιακό διάλυμα χλωριούχου χαλκού (CuCl/ NH<sub>3</sub>). Αν παρατηρήσουμε σχηματισμό κεραμέρυθρου ιζήματος συμπεραίνουμε ότι στο δοχείο περιέχεται η ένωση 1- πεντίνιο σύμφωνα με την αντίδραση:



Αν δεν παρατηρήσουμε σχηματισμό ιζήματος τότε είναι το 2- πεντίνιο ( $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$ ) το οποίο δεν διαθέτει θέση H.


**β.** Σε μέρος από την ποσότητα του κάθε δοχείου προσθέτουμε διάλυμα NaOH και θερμαίνουμε ώστε να υδρολυθούν οι εστέρες σύμφωνα με τις αντιδράσεις:



πρώτος τρόπος

Στη συνέχεια σε κάθε δοχείο προσθέτουμε I<sub>2</sub>/NaOH.


Στο δοχείο στο οποίο θα παρατηρήσουμε καταβύθιση κίτρινου ιζήματος CHI<sub>3</sub> περιέχεται η αλκοόλη CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>OH, που προέρχεται από CH<sub>3</sub>COOCCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>, σύμφωνα με την αντίδραση:



ή δεύτερος τρόπος

Στη συνέχεια σε κάθε δοχείο προσθέτουμε KMnO<sub>4</sub> / H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Στο δοχείο στο οποίο θα παρατηρήσουμε έκλυση αέριο CO<sub>2</sub> (φυσαλίδες) περιέχονται HCOONa και

$\text{CH}_3\text{OH}$ , τα οποία προέρχονται από τον εστέρα  $\text{HCOOCH}_3$ , σύμφωνα με τις αντιδράσεις:



Γ2.

- (A)  $\text{CH} \equiv \text{CH}$
- (B)  $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$
- (Γ)  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{Cl}$
- (Δ)  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{MgCl}$
- (Ε)  $\text{CH}_3 - \underset{\substack{\parallel \\ \text{O}}}{\text{CH}}$
- (Ζ)  $\text{CH}_3 - \underset{\substack{| \\ \text{OMgCl}}}{\text{CH}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
- (Θ)  $\text{CH}_3 - \underset{\substack{| \\ \text{OH}}}{\text{CH}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

Γ3.


Εστω  $\omega$  mol  $\text{C}_v\text{H}_{2v+1}\text{OH}$  (Α)

$\varphi$  mol  $\text{C}_\mu\text{H}_{2\mu+1}\text{OH}$  (Β)

$$m_{\mu\gamma\mu} = m_A + m_B \Rightarrow 44,4 = \omega(14v + 18) + \varphi(14\mu + 18) \quad (1)$$

Το κάθε μέρος θα περιέχει  $\omega/3$  mol (Α)  
και  $\varphi/3$  mol (Β)

Στο πρώτο μέρος:




Το αέριο που απελευθερώνεται είναι το  $\text{H}_2$

$$n_{\text{H}_2} = \frac{V_{\text{H}_2}}{22,4} = \frac{2,24}{22,4} = 0,1 \text{ mol}$$

$$\text{Άρα } \frac{\omega}{6} + \frac{\varphi}{6} = 0,1 \Rightarrow \omega + \varphi = 0,6 \quad (2)$$

Στο δεύτερο μέρος:






Τα προϊόντα της υδρόλυσης ταυτίζονται άρα  $v = \mu$ .

Από την (1) έχουμε:

$$44,4 = (\omega + \varphi)(14\mu + 18) \stackrel{(2)}{\Rightarrow} 44,4 = 0,6(14\mu + 18) \Rightarrow \mu = \nu = 4$$

Επομένως  $\begin{cases} (A) \\ (B) \end{cases} \text{έχουν } MT : C_4H_9OH$


Οι πιθανοί συντακτικοί τύποι είναι



Από τα ισομερή μόνο το I<sub>2</sub> δίνει αλογονοφορμική αντίδραση και το ισομερές του που μετά την υδρόλυση του Grignard δίνει ίδιο οργανικό προϊόν είναι το I<sub>1</sub>.


Στο τρίτο μέρος:

Έστω η (A) αντιστοιχεί στην  $CH_3CH_2 - \underset{OH}{\overset{|}{C}} - CH_3$  και είναι  $\omega/3$  mol



$$n_{ij} = \frac{\omega}{3} \quad \text{ή} \quad 0,05 = \frac{\omega}{3} \Rightarrow \omega = 0,15 \text{ mol}$$

Άρα (2)  $\Rightarrow \varphi = 0,45 \text{ mol. } CH_3CH_2CH_2CH_2OH$   
δηλαδή



## ΘΕΜΑ Δ


### Δ1.

Δοχείο	1	2	3	4	5
pH	1	5	7	11	13
Διάλυμα	Y <sub>3</sub>	Y <sub>5</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>4</sub>

Δ2 α.  $n_{NaOH} = C_{NaOH} \cdot V_{NaOH} = 0,1 \cdot 0,005 = 5 \cdot 10^{-4} \text{ mol.}$

$n_{o\xi} = C_{o\xi} \cdot V_{o\xi} = C_{o\xi} \cdot 0,01 = C_{o\xi} \cdot 10^{-2} \text{ mol.}$

Γίνεται η αντίδραση




Αρχ.	$C_{\text{oξ}} \cdot 10^{-2}$	$5 \cdot 10^{-4}$	-
Αντ./Παρ.	$-5 \cdot 10^{-4}$	$-5 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-4}$
Τελ.	$C_{\text{oξ}} \cdot 10^{-2} - 5 \cdot 10^{-4}$	0	$5 \cdot 10^{-4}$


στην ογκομέτρηση εξουδετερώνεται πλήρως το οξύ με την βάση άρα

$$C_{\text{oξ}} \cdot 10^{-2} - 5 \cdot 10^{-4} = 0 \Rightarrow C_{\text{oξ}} = \frac{5 \cdot 10^{-4}}{10^{-2}} \Rightarrow C_{\text{oξ}} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ M} = 0,05 \text{ M}.$$


β. Για να ανιχνεύσουμε την καρβοξυλομάδα στο διάλυμα προσθέτω  $\text{NaHCO}_3$  ή  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ή  $\text{CaCO}_3$  και παρατηρούμε έκλυση αερίου  $\text{CO}_2$ .



Για να ανιχνεύσουμε την υδροξυλομάδα προσθέτουμε στο διάλυμα  $\text{KMnO}_4/\text{H}^+$  και παρατηρούμε αποχρωματισμό



Δ3.




Βρίσκω τα mol

$$n_{\text{NaOH}} = C_4 \cdot V_4 = 0,1 \cdot V_4 \text{ mol}$$



$$n_{\text{NH}_4\text{Cl}} = C_5 \cdot V_5 = 0,1 \cdot V_5 \text{ mol.}$$

γίνεται η αντίδραση



αφού προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα, θα αντιδράσει όλη η ποσότητα του  $\text{NaOH}$ . Άρα:

$$C_{\text{NH}_3} = \frac{0,1 \cdot V_4}{V_{\text{τελ.}}} \text{ M}, \quad C_{\text{NH}_4\text{Cl}} = \frac{0,1 \cdot (V_5 - V_4)}{V_{\text{τελ.}}} \text{ M}, \quad C_{\text{NaCl}} = \frac{0,1 \cdot V_4}{V_{\text{τελ.}}} \text{ M}$$



$$K_b = \frac{[NH_4^+] \cdot [OH^-]}{[NH_3]} \Rightarrow K_{b_{NH_3}} = \frac{[0,1(V_5 - V_4) + x] \cdot x}{\frac{V_{teλ}}{\frac{0,1V_4 - x}{V_{teλ}}}} \quad (1).$$

Όμως pH = 9 áρα pOH = 5 áρα [OH<sup>-</sup>] = x = 10<sup>-5</sup>.


$$(1) \Rightarrow K_{b_{NH_3}} = \frac{0,1(V_5 - V_4) \cdot 10^{-5}}{0,1V_4} = \frac{(V_5 - V_4) \cdot 10^{-5}}{V_4} \quad (2).$$

$$K_b = \frac{[NH_4^+] \cdot [OH^-]}{[NH_3]} \Rightarrow K_{b_{NH_3}} = \frac{[0,1(V_5 - V_4) + x] \cdot x}{\frac{V_{teλ}}{\frac{0,1V_4 - x}{V_{teλ}}}} \quad (1).$$

Όμως pH = 9 áρα pOH = 5 áρα [OH<sup>-</sup>] = x = 10<sup>-5</sup>.

$$(1) \Rightarrow K_{b_{NH_3}} = \frac{0,1(V_5 - V_4) \cdot 10^{-5}}{0,1V_4} = \frac{(V_5 - V_4) \cdot 10^{-5}}{V_4} \quad (2).$$

Από το διάλυμα Y<sub>2</sub> έχουμε:




$$K_{b_{NH_3}} = \frac{y \cdot y}{0,1 - y} = \frac{y^2}{0,1}$$

Όμως pH = 11 áρα pOH<sub>2</sub> = áρα [OH<sup>-</sup>] = y = 10<sup>-3</sup>.

$$K_{b_{NH_3}} = \frac{(10^{-3})^2}{10^{-1}} = 10^{-5}$$

$$(2) \Rightarrow 10^{-5} = \frac{(V_5 - V_4) \cdot 10^{-5}}{V_4} \Rightarrow V_4 = V_5 - V_4 \Rightarrow 2V_4 = V_5 \Rightarrow \frac{V_4}{V_5} = \frac{1}{2}.$$


Δ4.



Άρα  $pOH=4$ .

$$\Sigma \text{το } Y'_2 \quad K_{b_{NH_3}} = \frac{[NH_4^+] \cdot [OH^-]}{[NH_3]} \Rightarrow 10^{-5} = \frac{10^{-4} \cdot 10^{-4}}{C'} \Rightarrow C' = 10^{-3} \text{ M}$$

$$\text{Όμως } C' = \frac{0,1 \cdot V}{V+x} \Rightarrow 10^{-3} = \frac{10^{-1} \cdot V}{V+x} \Rightarrow \frac{V+x}{V} = 10^2 \Rightarrow \frac{x}{V} = 100 - 1 = 99 \Rightarrow x = 99V.$$



Επομένως  $[OH^-] = 10^{-2}$ .

Στο  $Y'_4$



$C'_4 \quad C'_4 \quad C'_4 \quad \text{άρα } C'_4 = 10^{-2} \text{ M.}$

Όμως

$$C'_4 = \frac{0,1V}{V+y} \Rightarrow 10^{-2} = 10^{-1} \frac{V}{V+y} = 10 \Rightarrow \frac{y}{V} = 9 \Rightarrow y = 9V.$$

Ένα ρυθμιστικό διατηρεί το pH του όταν γίνεται αραίωση σε συγκεκριμένα όρια. (ώστε να ισχύουν οι προσεγγίσεις).


Αλλάζει η τιμή του pH, δηλαδή χάνει την ρυθμιστική του ικανότητα, όταν δεν ισχύουν οι προσεγγίσεις δηλαδή όταν γίνεται πολύ μεγάλη αραίωση. Αφού το pH μεταβλήθηκε κατά μία μονάδα συμπερείνουμε ότι δεν ισχύουν οι προσεγγίσεις άρα έγινε πολύ μεγάλη αραίωση.

Η σχέση είναι  $y < x < \omega$ .

ME

### B' τρόπος

Έστω ότι ρυθμιστικό αραιώνεται κατά 100V όπως και στην περίπτωση του διαλύματος Y2 (x=99V).



$$\Sigma \text{to } Y_6' \quad C'_{NH_3} = \frac{10^{-3}}{3} M = C'_{NH_4Cl}$$

$$pOH = pK_b + \log \frac{C'_{NH_4Cl}}{C'_{NH_3}} = 5 + \log 1 = 5.$$

Άρα pH= 9.

Παρατηρούμε ότι για τη μεταβολή του pH του ρυθμιστικού κατά μία μονάδα πρέπει ο όγκος του νερού που προστίθεται να είναι ω > x = 99 V.

Επομένως y < x < ω.